Evaluación de detección de cáncer colorrectal



La evaluación de detección de cáncer colorrectal

SALVA VIDAS

Hable con su médico sobre las opciones de evaluación de detección y cuándo empezar a hacerla.

FACTORES DE RIESGO

EDAD Las personas de 45 años en adelante

deben hacerse una evaluación de detección de cáncer colorrectal. Las personas menores de 45 años deben conocer los signos y síntomas y consultar

al médico si algo les preocupa.

SEXO Tanto los hombres como las mujeres

corren riesgo de sufrir cáncer colorrectal, pero el riesgo es mayor en los hombres.

ANTECEDENTES Quienes tengan antecedentes familiares

FAMILIARES de cáncer colorrectal deben empezar con la evaluación de detección antes de los

45 años. Consulte a su médico.

ORIGEN Los afroamericanos tienen el mayor índice de incidencia de cáncer colorrectal

de todos los grupos raciales en

ÉTNICO de todos los gru Estados Unidos.

Comuníquese con su proveedor de seguro de salud para saber si su seguro cubre la evaluación de detección de cáncer colorrectal.



OPCIONES DE DETECCIÓN

Hay dos pruebas de detección comunes disponibles en Providence:

COLONOSCOPÍA

- Control y detección.
- Prevención del cáncer de colon mediante extirpación de pólipos.
- Repita la evaluación cada 10 años si obtuviera resultados normales.
- Se requiere preparación previa.

PRUEBA INMUNOQUÍMICA FECAL (FIT)

- Solo evaluación.
- Prueba con muestra de heces. Si la prueba fuera positiva, habrá que hacer una colonoscopía.
- Repita una vez por año.
- No se indica ninguna restricción dietaria antes de la prueba.

REDUZCA SU RIESGO

- HÁGASE UNA EVALUACIÓN DE DETECCIÓN
- NO FUME
- HAGA EJERCICIO 30 MINUTOS POR DÍA
- LIMITE EL CONSUMO DE ALCOHOL
- COMA FRUTAS, VERDURAS Y GRANOS INTEGRALES
- CONTROLE SU PESO

Para saber más sobre los riesgos, la prevención y la detección del cáncer colorrectal: providenceoregon.org/colorectalcancerscreening 503-215-6014

