

구강암 및 두경부암 검사

암 검사

생명을 구합니다

조기 진단으로 생존 확률을 두 배 이상 높일 수 있습니다.

위험 요소

담배

모든 종류의 담배는 두경부암과 관련 있습니다.

알코올

모든 종류의 알코올성 음료 섭취는 구강, 목구멍, 후두 부위의 암 발병 위험을 높입니다.

일광 노출

입술 부위 암의 주요 원인입니다.

인체유두종바이러스(HPV) 감염

구강 인두(혀뿌리와 편도를 비롯한 인후) 부위 암의 약 70%는 성매개 바이러스인 HPV와 관련이 있습니다.

엡스타인바(EPSTEIN-BARR) 바이러스 노출

콧속, 코 뒤쪽 부위의 암과 침샘암의 발병 위험을 높입니다.

관련 사실

55만 건 전 세계적으로 구강암 및 두경부암이 매년 550,000건 이상 새로 진단됩니다.

2배 이들 암의 발병률은 여성보다 남성이 두 배 이상 높습니다.

40세 이상 40세 이상이 여기 나온 암들에 걸릴 위험이 더 크지만, 젊은 연령층에서도 발병할 수 있습니다.

위험을 줄이려면

의사와
상의합니다.

음주를
제한합니다.

종류와 관계없이 어떤
담배도 흡연하지
않습니다.

46세 미만은 HPV 백신에
대해 의사와 상의합니다.

HPV에 노출되기 전에 HPV 백신을
접종받으면 가장 좋은 효과를 낼 수
있습니다.

치과를 정기적으로
방문합니다.

이 암들은 몸에 문제를 야기하기 전까지
발견하지 못할 수 있습니다. 정기적인
병원 및 치과 방문으로 이상 변화를
발견하는 경우도 있습니다.